



# Aminomax 15

**FUNCIÓN:** Aminoácidos enriquecidos con K, Ca y Zn

**FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR:** GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Potasio	10.00%
Calcio	5.00%
Zinc	4.00%
Boro	1.00%
Agentes quelatantes y aminoácidos	15.50%
Acondicionadores y polisacáridos	2.00%
Diluyentes	62.50%

**CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS:** Densidad: 1.232-1.49 g/ml; pH: 5.01-5.49

**FORMULACIÓN:** Líquido

**PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN:** **Aminomax 15** es un bioestimulante líquido concentrado, formulado a base de 15 aminoácidos. El producto está fortalecido con potasio y boro, así como calcio quelatado, para lograr un mayor aprovechamiento del producto, por las raíces y el follaje de las plantas. El balance de aminoácidos que contiene **Aminomax 15** está diseñado de tal forma que resulta en una porción equilibrada y significativa para el buen desarrollo del cultivo. **Aminomax 15** contiene principalmente los siguientes aminoácidos: prolina y glicina relacionadas con el “amarre” de las flores en algunas especies; cisteína y metionina como aminoácidos azufrados para la integración y enlace de proteínas estructurales; serina, glutamato, fenilamina y triptófano ligados a la resistencia de la planta.

**INSTRUCCIONES DE USO:** Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese antes de usarse.



## DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis de aplicación
Solanáceas (Chile, tomate, papa)	1-2 L/ha por aplicación.
Cucurbitáceas (Melón, pepino, sandía, calabacita).	1-2 L/ha por aplicación.
Hortalizas en general (brócoli, coliflor, ajo, cebolla, etc.)	1-2 L/ha por aplicación.
Papaya	2 L/ha por aplicación cada 15 días.
Banano y mango	2 L/ha una vez por mes.
Frutales caducifolios	2 L/ha a la brotación y desarrollo inicial.
Maíz, sorgo, avena, arroz, trigo, granos y cereales en general	1-2 L/ha por aplicación, 2 a 3 aplicaciones en el ciclo.

**MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO:** Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Aminomax 15** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Aminomax 15** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

**METODO PARA USAR EL PRODUCTO:** Aplicación vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea.

**INCOMPATIBILIDAD:** **Aminomax 15** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:** Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

**TOXICIDAD:** **Aminomax 15** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

**Edición:** Agosto 2019.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

