



FUNCIÓN: Promotor del crecimiento de frutos

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Complejo de citocininas	2500 ppm
Complejo de giberelinas	2600 ppm
Nitrógeno	8.80%
Potasio	6.30%
Zinc	0.80%
Calcio	4.70%
Complejo de aminoácidos	2.00%
Agentes quelatantes y surfactantes	17.00%
Acondicionadores y diluyentes	59.89%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.254-1-331 g/ml; pH: 4.01-5.00

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Fruit Sizer® es un regulador de crecimiento altamente concentrado en citocininas, giberelinas y enriquecido con aminoácidos, potasio, calcio y boro. La mayoría de los frutos se desarrollan en dos etapas principales de crecimiento; la fase de división o multiplicación celular, que sucede en las primeras semanas, luego de la caída de pétalos, como señal de la fecundación; en esta etapa se define el tamaño potencial del fruto y se caracteriza por tener un alto requerimiento de citocininas, aminoácidos esenciales, calcio, boro y molibdeno. La segunda es una fase acelerada de crecimiento después de que los frutos han logrado un tercio de su tamaño potencial y presentan una mayor demanda de giberelinas, nitrógeno, aminoácidos y potasio; el balance de componentes hormonales y nutricionales que contiene **Fruit Sizer®** está diseñado de tal forma que resulta en una porción equilibrada y significativa para el buen desarrollo del cultivo y los frutos.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre el equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis	Momento de aplicación
Hortalizas	0.5-1 L/ha	En condiciones de bajas temperaturas en invernadero o campo abierto. Repetir cada 15 días
Frutales en general	0.5-1 L/ha	1 a 2 aplicaciones para el aumento y uniformidad de la fruta.
Banano y plátano	0.5 L/ha	Iniciar aplicaciones 2 semanas después de la apertura de brácteas.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Fruit Sizer**[®] puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Fruit Sizer**[®] cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea. Se puede aplicar el producto a través del sistema de riego a niveles de 0.5-1 L/ha.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 1 hr.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Fruit Sizer**[®] es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Fruit Sizer**[®] no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Agosto 2019.

.....
La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

