



FUNCIÓN: Madurador y retardante de crecimiento vegetal.

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.com.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Cloruro de mepiquat	10 000 ppm
Complejo de aminoácidos de origen vegetal y animal	5.00%
Potasio	25.00%
Azufre	6.00%
Boro	2.00%
Myo-inositol	1.00%
Extractos de origen vegetal	42.00%
Ácido fúlvico	2.00%
Acondicionadores y diluyentes	16.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.2511-1.3250 g/ml; pH: 7.45-8.30

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Brixxer 2X Plus® está diseñado especialmente con componentes que retardan el crecimiento y la elongación de tallos en algodón, caña, papaya, tomates indeterminados, etc., logrando con esto una mayor concentración de azúcares y solutos distribuidos en los órganos reproductivos y tallos, favoreciendo un incremento en la producción, tamaño y calidad de los mismos. El producto regula la longitud de tallos entre un 10 y un 20% menos, permitiendo la formación de plantas más compactas, equilibradas y productivas. Brixxer 2X Plus® debe emplearse en frutales y hortalizas cuando se observe un crecimiento vegetativo excesivo, poca formación y aparición de flores; o bien, cuando se tiene poco amarre de las mismas, causados por excesos de nitrógeno, agua y temperaturas altas.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis	Recomendaciones
Algodón	1-2 L/ha	2-3 repeticiones a partir de la formación de los primeros cuadros y basados en el vigor de las variedades
Caña de azúcar	0.5-1.0 L/ha	8-10 semanas antes del corte
Hortalizas en general	0.3-1.0 L/ha	En función al exceso de vigor que pretenda regularse
Frutales	1.0 L/ha	4 semanas previas a la cosecha

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Brixxer 2X Plus®** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Brixxer 2X Plus®** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea.

Días a cosecha: 0 días

Horas de reentrada al campo: 6 hrs.

Límite máximo de residuos: 0.05 ppm.

INCOMPATIBILIDAD: **Brixxer 2X Plus®** es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Brixxer 2X Plus®** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoqe el vómito y consulte a su médico.

Edición: Noviembre 2021.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

