

eBioluzion® Plus vO

FUNCIÓN: Insecticida de amplio espectro de acción.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Aceites de origen vegetal y animal (Aceite de <i>Allium</i> spp, Aceite de <i>Cinnamomum zeylanicum</i> , Aceite de <i>Piper nigrum</i> , Aceite de <i>Syzygium aromaticum</i> , Aceite de <i>Glycine max</i> , Soluble de pescado, Extracto de <i>Allium</i> spp)	28.00%
Terpenoides de origen vegetal	5.00%
Alcaloides de origen vegetal	2.00%
Esteroides	1.00%
Saponinas	5.00%
Aminoácidos totales	3.00%
Silicato de Calcio	1.00%
Ácido acético	0.40%
Agentes emulsificantes de origen orgánico	1.86%
Acondicionadores y diluyentes orgánicos	52.74%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: 0.977-1.022 g/ml; pH: 4.78-6.12

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: eBioluzion® Plus vO es un complejo de extractos vegetales y aceites esenciales, que tienen la capacidad de controlar y reducir las poblaciones de insectos, que causan pérdidas económicas y que son vectores de varias familias de virus. Los coadyuvantes orgánicos presentes en la formulación de eBioluzion® Plus vO favorecen la cicatrización de heridas, bloqueo de radicales libres y fortalecimiento de la pared celular. Los ingredientes de eBioluzion® Plus vO, tienen una gama muy amplia de efectos; alteran el sistema nervioso central y periférico con pérdida en la coordinación de movimientos y búsqueda de alimento, producción de irritabilidad y tetanización de músculos acompañada de una parálisis total y muerte por inanición, interrupción del proceso de muda y disrupción del aparato reproductor y repelencia.



INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar y al suelo vía cintilla o en drench.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Plaga	Dosis	Frecuencia de aplicación
Chile, tomate, berenjena y papa	Acaros, Paratrioza, mosquita blanca, trips, gusano de fruto, barrenadores, chinches y piojo harinoso	1-1.5 L/ha	7-10 días
Arándano, frambuesa, zarzamora, fresa			
Pepino, melón, sandía, calabacita y tomatillo			
Aguacate y frutales	Mosquita blanca, trips, gusano de fruto, barrenadores, chinches y piojo harinoso	1.5-2 L/ha	21 días

eBioluzion® Plus vO puede ser usado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos, sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **eBioluzion® Plus vO** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

Días a cosecha: 0 días.

Horas de reentrada al campo: 4 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **eBioluzion® Plus vO** es compatible con la mayoría de los agroquímicos, sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **eBioluzion® Plus vO** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Diciembre 2020.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

