FICHA TÉCNICA

FUNCIÓN: Fungicida inductor de resistencia a hongos foliares.

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50 y 488-55-61. ventas@greencorp.mx

Composición garantizada	% (P/V)
Cis Jasmone	5000 ppm
Chitosan (Poly D Glucosamina)	2.00%
Acondicionadores y aminoácidos totales	30.00%
Emulsificantes y quelatantes	10.00%
Diluyentes	57.50%

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.0470-1.0850 g/ml; pH: 6.28-7.48

FORMULACIÓN: Líquido

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Fullkover HF® es una nueva alternativa para el manejo integrado de enfermedades que afectan las hojas, flores y frutos de las plantas. **Fullkover HF®** induce la autodefensa de las plantas al ataque de hongos. Los mecanismos que activa en los cultivos son los siguientes: favorece la detección de invasores y respuestas hipersensitivas a daños mecánicos y por hongos, así como la activación de la síntesis de proteínas, fitoalexinas, compuestos aromáticos, peróxido de hidrógeno, reguladores de crecimiento y substancias en general, relacionadas con los mecanismos de defensa a plagas, patógenos y alteraciones ambientales, a través de la translocación de compuestos de defensa a la zona afectada para eliminar y cicatrizar el tejido dañado, evitando el avance o supervivencia del fitopatógeno.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Momento de aplicación
Pepino, calabacita, sandía, melón y hortalizas en general	Mildiu polvoriento (*Erysiphe cichoracearum*), mildius y cenicillas en general	0.5 cc/L de agua	Invernadero y almacigo (Plántulas)
		250 cc/ha en 150 L de agua	Plantas jóvenes en desarrollo (4 semanas en campo).
		300-500 cc/ha cada 15 días	Plantas en etapas vegetativas
		0.75-1.0 L/ha	Plantas en floración y desarrollo de frutos
Banano	Sigatoka negra	1.0-1.5 L/ha	Alternando con otros fungicidas
Frutales templados y tropicales	Mildius, cenicillas y otros	1.0-2.0 L/ha	Según la edad de los árboles

FICHA TÉCNICA

En presencia de un alto grado de infección o antecedentes de una fuerte incidencia de enfermedades en el lote, o de alta susceptibilidad del cultivo y variedad, aplíquese una dosis de 1-1.5 L/ha en mezcla con **K boron Ca** este a razón de 1.0 L/ha.

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente que contenga la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. **Fullkover HF®** puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Fullkover HF®** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad.

METODO PARA USAR EL PRODUCTO: Aplicación vía foliar; terrestre (con bomba de mochila, aspersores de aguilón y/o cañón aspersor) o aérea.

Días a cosecha: 0 días
Horas de reentrada al campo: 4 hrs.
Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: Fullkover HF® solo deberá mezclarse con productos registrados en los cultivos autorizados. **Fullkover HF®** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

MANEJO DE LA RESISTENCIA: "Para prevenir el desarrollo de poblaciones resistentes siempre respete la dosis y las frecuencias de aplicación; evite el uso repetido de este producto, alternándolo con otros grupos químicos de diferentes modos de acción y diferentes mecanismos de destoxificación mediante el apoyo de otros métodos de control".

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos. No se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: Fullkover HF® no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto está clasificado como ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Noviembre 2021.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V.
Blvd. Luis Donaldo Colosio No. 1858. Col. San Patricio, Saltillo Coahuila México. CP. 25204
Tels.: (844) 439 00 48-50 ventas@greencorp.mx www.greencorp.mx