



FUNCIÓN: Repelente insecticida compuesto a base de productos orgánicos. Bioinsecticida

FABRICADO Y DISTRIBUIDO POR: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio, No. 1858, Col. San Patricio, Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.mx

Composición química	% (P/V)
Terpenoides de origen vegetal (Terpenos cítricos, oleorresinas de <i>Capsicum</i> spp).	12.00%
Alcaloides de origen vegetal (Oleorresinas de <i>Capsicum</i> spp).	1.00%
Ácidos grasos y aminoácidos totales.	14.00%
Sulfonatos y compuestos azufrados (Extractos y aceites de <i>Allium</i> spp).	1.00%
Acondicionadores y diluyentes.	72.00%

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS: Densidad: (1.008-1.074) g/ml; pH: 5.02-6.68

FORMULACIÓN: Líquido.

PROPIEDADES Y MODO DE ACCIÓN: Pestil Out® es un producto complejo de acción Repelente-Insecticida-acaricida de amplio espectro, el cual está formulado a base de extractos vegetales y solubles de origen marino. Pestil Out® provee a la planta de excelentes niveles de repelencia y participa, además de manera efectiva en el control de larvas de lepidópteros e insectos chupadores que atacan los cultivos. Ejerce efecto de derribe por contacto y una buena acción sistémica proporcionada por los extractos naturales por lo que se recomienda la aplicación en conjunto con un penetrante.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese vigorosamente antes de usarse. Aplicación foliar.



DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis de aplicación	Frecuencia
Calabacita, melón, sandía, pepino, brócoli, coliflor, hortalizas en general, berrys, frutales y ornamentales.	1-2 L/ha para mosquita blanca (<i>Bemisia tabaci</i>) ácaros, áfidos, psílidos, minadores, etc.	Como repelente en ausencia de la plaga aplicar a intervalos de 10 a 15 días. En presencia de la plaga a intervalos de 5 a 7 días.

Algunas plagas específicas no contempladas en la tabla anterior también pueden ser controladas, por lo que se sugiere realizar pruebas a dosis variadas.

Bajo condiciones de invernadero, para la producción de flores y hortalizas, se sugiere emplear la mitad de la dosis arriba recomendada, con aplicaciones semanales.

Pestil Out® puede ser aplicado solo o combinado con otros productos en aplicaciones foliares, utilizando el equipo convencional para estos propósitos; sugiriendo se emplee agua limpia. Se recomienda realizar las aplicaciones de **Pestil Out®** cuando las condiciones ambientales sean favorables (bajo viento, temperatura regular y sin lluvia), para asegurar una buena dispersión y permanencia del producto sobre las plantas y su efectividad sobre las plagas.

Días a cosecha: 1 día, cultivos de hojas

Horas de reentrada al campo: 6 hrs.

Límite máximo de residuos: No tiene.

INCOMPATIBILIDAD: **Pestil Out®** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Pestil Out®** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas en la etiqueta. El producto es considerado ligeramente tóxico. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

Edición: Diciembre 2020.

La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición.

